



## DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS – DST

8º ANO

BIOLOGIA

LUCIANA ARAUJO

4º Bimestre

DOENÇAS	AGENTE	SINTOMAS	TRANSMISSÃO	PROGNÓTICO
Candidíase	<i>Cândida albicans</i> – Fungo.	*Coceira na área vaginal. *Dor e vermelhidão na área vaginal. *Corrimento vaginal branco e agrupado, parecido com queijo cottage. *Relações sexuais dolorosas. *Pequenas feridas na região da glândula.	Se desenvolve naturalmente no corpo. Podendo ser transmitida através do ato sexual.	Mais frequente na mulher não tem consequências mais graves.
Herpes Genital	Herpes simplex TIPO1 ou TIPO2.	Bolinhas vermelhas ou cor-de-rosa na região genital que se rompem após cerca de 2 dias, soltando um líquido transparente; Dor, ardor e coceira intensa; Dificuldade para urinar.	Através do contato íntimo vaginal, anal ou oral	Pode contagiar o bebê nascido de parto normal. Pode causar feridas no colo do útero.
Gonorreia	<i>Neisseriagonorrhoeae</i>	HOMEM:	Através do contato	HOMEM: Esterilidade

	Bactéria	<p>*Dor e ardência ao urinar.</p> <p>*Secreção abundante de pus pela uretra.</p> <p>*Dor ou inchaço em um dos testículos.</p> <p>MULHER:</p> <p>*Aumento no corrimento vaginal, que passa a ter cor amarelada e odor desagradável</p> <p>*Dor e ardência ao urinar</p> <p>*Sangramento fora do período menstrual</p> <p>*Dores abdominais</p> <p>*Dor pélvica.</p>	íntimo vaginal, anal ou oral.	<p>MULHER: Infertilidade</p> <p>RECEM NASCIDO: Cegueira</p>
Condiloma Acuminado	Papilomavírus humano (HPV).	Verrugas de tamanhos variáveis.	Através do contato íntimo vaginal, anal ou oral.	Ligado ao câncer de útero, pênis e outros
Sífilis	<i>Treponema pallidum</i> Bactéria	<p>1º FASE: feridas indolores (cancros).</p> <p>2º FASE: manchas em várias partes do corpo (inclusive mãos e pés)</p> <p>3º FASE: afeta vários órgão.</p>	Através do contato íntimo vaginal, anal ou oral.	<p>Lesões no sistema circulatório e nervoso.</p> <p>Malformação e morte do recém nascido.</p>